

## ご入園・ご進級おめでとうございます。


この保健便り“ぐんぐん”では、保健に関する話題をお届けします。4月号は『感染症と出席停止』についてお知らせします。

学校伝染病にかかった時には、園を休まなければなりません。園を休む間は「出席停止」という扱いになり「欠席」にはなりません。学校伝染病と診断された時はすぐに連絡をお願いします。「医師の許可」が出るまでは登園できませんのでよろしくお願いします。(診断書は必要ありません)

自園では、蔓延防止のため欠席させる場合も、『出席停止扱い』にします。

(例えば…本人は発症していないが、家族がインフルエンザ罹患で本人も感染のおそれがあるので休ませる場合など)

## ☆学校伝染病の種類及び出席停止期間

	伝染病の種類	出席停止期間
第一種	エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・南米出血熱・痘そう・ペスト・ラッサ熱 重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS コロナウイルスであるものに限る) マールブルグ病・急性灰白髄炎(ポリオ)・ジフテリア・鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属、インフルエンザAウイルスであってその血清型がH5N1であるものに限る)	治癒するまで 

	伝染病の種類	出席停止期間	主な症状
第二種	インフルエンザ	発症後5日経過し、かつ解熱後3日を経過するまで	急な発熱、頭痛、筋肉痛、咽頭痛、全身倦怠感、咳
	百日咳	特有の咳が消失するまで	2週間以上続く咳、吸気性笛声
	麻疹(はしか)	解熱した後3日を経過するまで	発熱、咳、鼻水、眼脂、結膜充血、コプリック斑、発疹
	流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで	発熱、頭痛、全身倦怠感、耳下腺の腫脹
	風疹	発疹が消失するまで	バラ紅色の発疹、リンパ節腫脹
	水痘(みずぼうそう)	すべての発疹が痂皮化するまで	発熱、紅斑、水疱、痂皮
	咽頭結膜熱(プール熱)	主要症状が消退した後2日を経過するまで	発熱、咽頭痛、結膜炎
第三種	結核	症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで	2週間以上続く咳、痰、微熱、倦怠感
	腸管出血性大腸菌感染症		激しい腹痛、下痢、血便
	流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎	症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで	結膜充血、眼脂、角膜障害 結膜充血、眼脂、結膜下出血

\*その他感染症(手足口病、伝染性紅斑(リンゴ病)、マイコプラズマ肺炎、ヘルパンギーナ、ウイルス性肝炎、溶連菌感染症、流行性嘔吐下痢症などについては、必要があれば、学校医の意見を聞き、第3種の感染症として措置をとることができる疾患です。罹患した場合、園では出席停止にします。